

確率数理工学5

● モーメント母関数と特性関数

Def (モーメント母関数)

$t \in \mathbb{R}$: パラメータ

X : r.v.

$$M(t) \stackrel{\text{def}}{=} E[e^{tx}]$$

→ モーメント母関数 と言う。

Cor (モーメント母関数とモーメント)

$$\mu_j = E[X^j] \quad (j=0, 1, 2, \dots) : j\text{-次モーメント}$$

$$M(t) = E[e^{tx}] = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{t^j}{j!} \mu_j \quad (\text{テイラー展開})$$

と書ける。

$$\uparrow E\left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{t^j}{j!} |X|^j\right] < \infty \text{ とする}$$

$$M(0) = 1, \quad M'(0) = \mu, \quad M''(0) = \mu_2, \quad \dots, \quad M^{(k)}(0) = \mu_k$$

⇒ M を微分して $t=0$ を代入すれば、 k -次モーメントが得られる。

注: e^{tx} は必ずしも 積分可能 ではない。

Def (特性関数)

t : パラメータ

X : r.v.

$$\phi(t) \stackrel{\text{def}}{=} E[e^{itx}] = E[\cos(tx)] + i E[\sin(tx)]$$

を 特性関数 (characteristic function) と呼ぶ。

$$|\phi(t)| \leq 1 : \text{可積分}$$

→ 任意の t に対し特性関数の値は確定する

Cor (特性関数とモーメント)

ある k (自然数) で $E[|X|^k] < \infty$ とする. ($\mu_k = E[X^k]$ が存在)

$$\phi^{(k)}(t) = E[(iX)^k e^{itX}] \quad (\phi \text{ の } k \text{ 回微分})$$

$$\phi^{(k)}(0) = E[(iX)^k] = i^k \mu_k$$

よって. $\mu_k = \frac{\phi^{(k)}(0)}{i^k}$

特に. $E[X] = \frac{\phi'(0)}{i}$

$$\text{Var}[X] = -\phi''(0) + \phi'(0)^2 \\ (= \mu_2 - \mu_1^2)$$

※ 本当は積分と微分の交換には条件が必要だが. 上記の条件では OK.

(ある可積分な Z が存在して $|\frac{\partial}{\partial t} g(t, X)|_{t=t_0} \leq Z$ ($t_0 - \varepsilon \leq t \leq t_0 + \varepsilon$)
のとき. $\frac{\partial}{\partial t} E[g(t, X)]|_{t=t_0} = E[\frac{\partial}{\partial t} g(t, X)|_{t=t_0}]$ とする.)

Cor (特性関数の性質)

(1) $\phi(0) = 1$, $|\phi(t)| \leq 1$, $\phi(-t) = \overline{\phi(t)}$

(2) $\overline{\phi(t)}$ は $-X$ の特性関数

(3) $\phi(t)$ は \mathbb{R} 上の連続関数 ← 優収束定理

(4) $Y = aX + b$ とし. X と Y の特性関数を $\phi_X(t)$, $\phi_Y(t)$ とすると.

$$\phi_Y(t) = E[e^{it(ax+tb)}] = e^{itb} \phi_X(at)$$

Ex. (正規分布の特性関数)

$$\phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \exp(itx) dx$$

$$= \exp(it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$$

← 2-2-9 積分定理より

$$\phi'(t) = (i\mu - \sigma^2 t) \exp(it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$$

$$\phi''(t) = -\sigma^2 \exp(it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$$

$$+ (i\mu - \sigma^2 t)^2 \exp(it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$$

∴

$$\left. \begin{array}{l} \phi'(0) = i\mu \\ \phi''(0) = -\sigma^2 - \mu^2 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} E[X] = \frac{\phi'(0)}{i} = \mu \\ \text{Var}[X] = -(-\sigma^2 - \mu^2) - \mu^2 \\ = \sigma^2 \end{array} \right. //$$

Ex. (二項分布)

$$f(x) = \binom{n}{x} \theta^x (1-\theta)^{n-x}$$

$$\phi(t) = \sum_{x=0}^n e^{itx} \binom{n}{x} \theta^x (1-\theta)^{n-x}$$

$$= \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (e^{it}\theta)^x (1-\theta)^{n-x}$$

$$= (e^{it}\theta + (1-\theta))^n$$

$$\phi'(0) = n\theta i \Rightarrow E[X] = \frac{\phi'(0)}{i} = n\theta$$

$$\phi''(0) = -\theta^2 n(n-1) - \theta n$$

$$\Rightarrow \text{Var}[X] = -\phi''(0) + \phi'(0)^2$$

$$= \theta^2 n(n-1) + \theta n - (n\theta)^2$$

$$= n\theta(1-\theta) //$$

Def (モーメント母関数)

X : r.v., $\phi(t)$: X の特性関数

$\psi(t) \stackrel{\text{def}}{=} \ln \phi(t)$ (\ln : 自然対数, $\ln e = 1$)

ψ は モーメント母関数 と呼ぶ

$$\psi(t) = \ln \phi(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(it)^j}{j!} k_j$$

と展開した時、 k_j は j 番目のモーメント と呼ぶ
(j 次モーメント)

Cor (モーメント母関数とモーメントの関係)

s : 自然数

$$\psi^{(s)}(0) = i^s k_s \quad (*)$$

$$k_s = \frac{\psi^{(s)}(0)}{i^s}$$

Cor (平均値まわりの $\tau - \mu = t$ と $\tau_2 = \mu + t$ の関係)

$$\psi(t) = \ln E[e^{itX}]$$

$$= \ln E[e^{it(X-\mu) + it\mu}]$$

$$= it\mu + \ln \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(it)^j}{j!} V_j \right) \quad (V_j = E[(X-\mu)^j])$$

$$1 + \underbrace{\sum_{j=2}^{\infty} \frac{(it)^j}{j!} V_j}_{(*)} \quad (\because V_1 = 0)$$

$$= it\mu + (*) - \frac{1}{2} (*)^2 + \frac{1}{3} (*)^3 + \dots \quad \left(\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \dots \right)$$

$$= it\mu + \frac{(it)^2}{2!} V_2 + \frac{(it)^3}{3!} V_3 + \frac{(it)^4}{4!} V_4 + \frac{(it)^5}{5!} V_5 + \frac{(it)^6}{6!} V_6 + \dots$$

$$- \frac{1}{2} \cdot \frac{(it)^4}{2!2!} V_2 V_2 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{(it)^5}{2!3!} V_2 V_3 - \frac{1}{2} \cdot \frac{(it)^6}{3!3!} V_3 V_3 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{(it)^6}{2!4!} V_2 V_4 + \dots$$

$$+ \frac{1}{3} \cdot \frac{(it)^6}{2!2!2!} V_2 V_2 V_2 + \dots$$

$t, t^2, t^3, t^4, t^5, t^6$ の係数を比較すると

$$k_1 = \mu$$

$$k_4 = V_4 - 3V_2^2$$

$$k_2 = V_2 = \sigma^2$$

$$k_5 = V_5 - 10V_2V_3$$




$$k_3 = V_3$$

$$k_6 = V_6 - 15V_2^2V_3 - 15V_2V_4 + 30V_3^2$$

Def (歪みと尖り)




歪み (skewness)

$$\beta_1 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{k_3}{k_2^{3/2}} = \frac{V_3}{\sigma^3}$$



尖り (kurtosis)

$$\beta_2 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{k_4}{k_2^2} = \frac{V_4 - 3V_2^2}{\sigma^4}$$



(正規分布)

Ex: (正規分布の歪みと尖り)

$$\psi(t) = \exp(it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$$

$$\psi(t) = it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2$$

$$\begin{cases} \psi'(t) = i\mu - \sigma^2 t \\ \psi''(t) = -\sigma^2 \\ \psi^{(k)}(t) = 0 \quad (k \geq 3) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} k_1 = \mu \\ k_2 = \sigma^2 \\ k_3 = k_4 = k_5 = \dots = 0 \end{cases}$$